

## 造影 CT 検査の予約の方

★造影剤使用問診票、造影剤使用同意書をご記入の上、必ずお持ちください。

★昼食は、食べないでお越し下さい。 ※水分は取っても問題はありません。

★以前に造影剤により具合が悪くなったことのある方は検査を受ける前にお知らせください。

★服用中の薬については、主治医の先生にご相談ください。

## 造影 CT 検査について

1. 造影 CT 検査は、より正確な画像情報を得るために CT 用造影剤(ヨード)を静脈に注射して行います。造影剤を使用しなくても検査は可能ですが、正確な診断には造影検査が必要となる場合があります。ほとんどが尿として排泄されます。造影剤により以下のような副作用が報告されています。

### 1)CT 用造影剤の副作用

#### ①軽い副作用

吐き気・嘔吐・熱感・頭痛・めまい・動悸・かゆみ・発疹・咳などが、5%以下の割合(100人中5人位)で起こります。

#### ②重い副作用

血圧低下・呼吸困難・意識障害などが、約0.004%の割合(2.5万人に1人)で起こります。

また、ごくまれに0.00025%(40万人に一人)の割合で死亡例が報告されています。

#### ③造影剤の血管外漏出

造影剤を勢いよく注入することで、血管外に漏れ出す場合があります。

少量漏れた場合は特別な処置は必要ありませんが、多量に漏れた場合は処置が必要になることがあります。

### 2)副作用への体制

当院では、医師または看護師が検査中の様子を観察しています。

万一に重い副作用が起きた場合は迅速に処置が行えるように体制を整えています。

### 3)ヨード造影剤の禁忌

ヨード過敏・ヨード造影剤の副作用の既往、気管支喘息、褐色細胞腫、骨髄腫、マクログロブリン血症、テタニー、重篤な甲状腺疾患、腎機能低下、重篤な心疾患の方は造影検査ができない場合があります。

糖尿病でビグアナイド系糖尿病製剤を飲んでいる方は、内服方法で注意事項があります。

医師の指示に従って下さい。

## 2. 検査時の注意

造影剤投与中に体が熱く感じますが、数分でおさまります。

それ以外で体に異常を感じた場合は遠慮せずにお知らせください。

## 3. 授乳中の方

検査終了後1~2日は、授乳をしないでください。



# 造影剤使用 同意書

院長殿

私は、造影剤を使用する検査を受けるにあたり、目的や方法、起こりうる副作用について説明を受け、理解したので検査を受けることに同意します。また、合併症や副作用を含む不測の事態（緊急の場合）には担当医の判断で治療・処置を受けることに同意します。

※本同意書を提出後も検査の実施前までにご自由に撤回できます。

年 月 日

本人署名

代理人署名

続柄( )